

Por qué el avistaje de aves en esta región?

Aves de la región

En el mundo hay alrededor de 9800 especies de aves, pertenecientes a unos 29 órdenes. La mayor riqueza de aves se encuentra en Sudamérica, con 1/3 de las especies. En Argentina existen unas 975 especies, agrupadas en 84 familias, dentro de 23 órdenes. En San Martín de los Andes hay unas 189 especies, casi 18% del total del país, representando 41 familias agrupadas en 19 órdenes.

Algunas de estas especies son permanentes (residentes o migratorias), pero otras son especies "vagantes", con pocos registros a lo largo de un siglo o "accidentales" con solo un registro comprobado. Del total de especies, 165 tienen presencia ya confirmada, pero otras 24 son raros o difíciles de ver, otros comunes y otros muy abundantes.

Ambientes

Podemos diferenciar 4 ambientes: estepa, bosque, altas cumbres y humedales.

El ambiente de estepa, hacia el este, se caracteriza por hábitats semi-áridos compuestos de estepas herbáceo-arbustivas sobre mesetas y terrazas. Con precipitaciones de entre 300 y 1500 mm anuales, veranos secos, y fuertes nevadas en el invierno, alcanza temperaturas medias que oscilan entre 9 y 13º C. Una de las asociaciones más típicas de este ambiente es la de neneo (*Mulinum spinosum*) y coirón (*Stipa* spp.). Algunos humedales (localmente llamados "mallines") y valles de ríos interrumpen la aridez y son especialmente ricos en aves. Entre las aves típicas de la estepa y sus mallines encontramos el choike *Pterocnemia pennata*, la copetona *Eudromia alegans*, numerosas rapaces, loros *Cyanoliseus patagonus*, y dentro de los pájaros la diuca *D. diuca*, los canasteros del género *Asthenes*, la Loyca *Sturnella loyca* y los gauchos del género *Agriornis*.

El ambiente de bosque incluye bosques de hayas australes (*Nothofagus*) que dominan las laderas de la cordillera, bosques ecotonales o de transición con la estepa (caracterizados por cipreses, maitenes y chacayes), comunidades dominadas por *Araucaria araucana* hacia el norte y selva valdiviana hacia el oeste. Las precipitaciones son mayores a los 800 mm en bosques ecotonales, tipicamente superiores a los 1500 mm en bosques de hayas australes, alcanzando los 4000 mm en la selva valdiviana. El verano suele ser seco mientras que el invierno presenta fuertes nevadas, mayores hacia el oeste. La temperatura media oscila entre los 7 y los 11 º C. La diversidad de aves es menor que en la estepa, pero en contraparte existen numerosos endemismos y familias típicas de la región subantártica. Son típicos el carpintero patagónico *Campephilus magellanicus*, la paloma araucana *Columba araucana*, el picaflor rubí *Sephanoides sephanoides*, los tapaculos de la familia Rhinocryptidae, el fiofio *Elaenia albiceps* y el tordo *Cureus cureus*.

Las altas cumbres se refieren a todos los ecosistemas que existen en los cordones montañosos por encima del límite del bosque, a 1800 msnm: pastizales, estepas y mallines altoandinos. Las nevadas son frecuentes durante todo el año, y las temperaturas medias son menores a los 7º C. La vegetación está bien adaptada al frío y a los vientos dominantes, siendo frecuentes las formas achaparras y "cojines", y algunos mallines. Algunas especies como el Cóndor *Vultur gryphus* habitan durante todo el año, pero muchas otras llegan en el verano desde el Norte y solo es posible verlas en estos sitios. Son típicas las dormilonas del género *Muscisaxicola* y los yales del género *Phrygilus*, mientras que algunas especies como las agachonas (Familia Thinocoridae) son características tanto de los ambientes altoandinos como de la estepa hacia el oeste.

Los ambientes acuáticos son los sitios de mayor riqueza. Incluyen indistintamente lagos, lagunas, ríos o arroyos, y humedales de todo tipo, dentro del bosque o la estepa.

Numerosos patos, macaes, gallaretas, cisnes, cormoranes y gaviotas habitan los cuerpos de agua. Algunas especies son típicas de las costas o viven en la vegetación palustre. Entre ellas encontramos las remolineras del género *Cinclodes*, el junquero *Phleocryptes melanops* y los barrilleros de ala amarilla *Agelaius thilius*.

Las áreas urbanas incluyen las cosmopolitas Gorriones y Palomas. Respecto de las áreas rurales gran cantidad de especies han experimentado una nítida expansión desde el norte argentino, tales como el jilguero dorado *Sicalis flaveola*, o el Benteveo *Pitangus sulphuratus*.

Río Hermoso

HOTEL DE MONTAÑA

PARQUE NACIONAL LANIN

Río Hermoso Hotel de Montaña

Ruta 63 km 67, Paraje Río Hermoso, Neuquén.
Parque Nacional Lanín, Patagonia Argentina.
Tel: 54 2972 410 485
info@riohermoso.com
www.riohermoso.com